

# تتبع تحول كيميائي

## I - التحول الكيميائي - التفاعل الكيميائي -

### (1) التحول الكيميائي

التحولات الكيميائية هي تحولات تطرأ بين أنواع كيميائية -تحتفي كليا أو جزئيا - في ظروف معينة تسمى بالمتفاعلات وتؤدي إلى تكون أنواع كيميائية جديدة تسمى بالنواتج .

نسمي **المجموعة الكيميائية** : مجموع الأنواع الكيميائية المتواجدة في وسط التفاعل .

ملحوظة : خلال التحول الكيميائي قد نجد أحيانا بعض الأنواع الكيميائية لا تطرأ عليها أي تحول ، تسمى بأنواع كيميائية غير نشطة .

### (2) الحالة البدئية - حالة التحول والحالة النهائية

- الحالة البدئية : هي حالة المجموعة الكيميائية قبل انطلاق التحول .

- الحالة التحول : هي حالة المجموعة الكيميائية في لحظة معينة خلال التحول .

- الحالة النهائية : هي حالة المجموعة الكيميائية عند انتهاء التحول .

### (3) التفاعل الكيميائي ومعادلته

التفاعل الكيميائي هو نموذج وصفي للتحول الكيميائي على المستوى الماكروسكوبي .

المعادلة الكيميائية هي كتابة رمزية لتفاعل كيميائي

في المعادلة الكيميائية : - يمثل كل نوع كيميائي بصيغته الكيميائية .

- نستعمل سهما موحها من اليمين إلى اليسار لتمثيل منحى التفاعل الكيميائي .

- توضع صيغ المتفاعلات على اليسار وصيغ النواتج يمين السهم .

- ويجب أن تكون المعادلة الكيميائية متوازنة . وبصفة عامة تكتب معادلة التفاعل كما يلي :



A و B المتفاعلات . C و D نواتج التفاعل .

$\alpha$  و  $\beta$  و  $\gamma$  و  $\delta$  أعداد صحيحة تسمى **المعاملات الستوكيومترية** .

## III - تقدم التفاعل - الجدول الوصفي لتقدم التفاعل

### (1) تقدم التفاعل

لتتبع تطور كميات مادة الأنواع الكيميائية المشاركة في التفاعل الكيميائي نستعمل **تقدم التفاعل** الذي يُرمز إليه ب :  $x$  ويعبر عنه بالمول . وهو يمثل كمية مادة المتفاعلات المختفية و كمية مادة النواتج المكونة حسب المعاملات الستوكيومترية .

### (2) جدول تقدم التفاعل

لتتبع تطور التفاعل نشئ جدول وصفي باستعمال تقدم التفاعل يسمى **جدول تقدم التفاعل** . وبصفة عامة لرسم جدول تقدم تفاعل معين يجب كتابة معادلة التوازن متوازنة . ثم رسم الجدول بالطريقة التالية :

$\alpha A + \beta B \rightarrow \gamma C + \delta D$				معادلة التفاعل	
كميات المادة بالمول				التقدم	الحالات
$n_i(A)$	$n_i(B)$	0	0	0	الحالة البدئية
$n_i(A) - \alpha.x$	$n_i(B) - \beta.x$	$\gamma.x$	$\delta.x$	$x$	حالة التحول
$n_i(A) - \alpha.x_f$	$n_i(B) - \beta.x_f$	$\gamma.x_f$	$\delta.x_f$	$x_f$	الحالة النهائية

### (أ) تعريف

### (3) التقدم الأقصى

نسمي **التقدم الأقصى** الذي يُرمز إليه ب :  $x_{max}$  : تقدم التفاعل الذي يوافق الاختفاء الكلي للمتفاعل المحدد .


### (ب) تطبيق رقم 1

يحترق الحديد الصلب في غاز ثنائي الأوكسجين  $O_2$  وينتج عن هذا التفاعل أكسيد الحديد المغناطيسي  $Fe_3O_4$  الصلب .

(1) اكتب معادلة التفاعل ووازنها .

(2) ارسم جدول تقدم التفاعل بالنسبة لخليط بدئي مكون من  $3mol$  من الحديد و  $4mol$  من  $O_2$  .

(3) حدد التقدم الأقصى والمتفاعل المحدد .



(1) معادلة التفاعل :


(2) جدول تقدم التفاعل :

3 Fe + 2 O <sub>2</sub> -----> Fe <sub>3</sub> O <sub>4</sub>			معادلة التفاعل	
كمية المادة : mol			الحالات	
3	4	0	0	الحالة البدئية
3 - 3x	4 - 2x	x	x	حالة التحول
3 - 3x <sub>max</sub>	4 - 2x <sub>max</sub>	x <sub>max</sub>	x <sub>max</sub>	الحالة النهائية
3 - 3x <sub>1</sub> = 0	4 - 2x <sub>1</sub> = 2	1	1	

(3) إذا افترضنا أن Fe هو المحد :  $3 - 3x_{max} = 0 \Leftrightarrow 3x_{max} = 3$  أي :  $x_{max} = 1mol$

إذا افترضنا أن O<sub>2</sub> هو المحد :  $4 - 2x_{max} = 0 \Leftrightarrow 2x_{max} = 4$  أي :  $x_{max} = 2mol$

بما أن : 1mol أصغر من 2mol فإن التقدم الأقصى لهذا التفاعل :  $x_{max} = 1mol$  وبالتالي المتفاعل المحد هو : Fe .  
التفسير المبياني : نحصل عليه بتمثيل كمية مادة المتفاعلات المتبقية خلال التحول بدلالة تقدم التفاعل .  
وكمية مادة النواتج المتكونة خلال التحول بدلالة تقدم التفاعل .



يجب عدم تمديد الخطوط بعد  $x_{max}$  لأن التفاعل يتوقف عند هذه القيمة ويصبح تركيب الخليط في نهاية التفاعل كما يلي :

$n_f(Fe) = 0$  المتبقية و :  $n_f(O_2) = 2mol$  المتبقية و :  $n_f(Fe_3O_4) = 1mol$  المتكون

ملحوظة : إذا انطلقنا في البداية من خليط مكون من 6mol من Fe و 4mol من O<sub>2</sub> نجد نفس  $x_{max} = 2mol$  في هذه الحالة المتفاعلين كلاهما محد . نقول أن الخليط البدئي ستوكيومترى .

ج) تطبيق رقم 2

علما بالاحتراق الكامل لغاز البنتان C<sub>5</sub>H<sub>12</sub> في غاز ثنائي الأوكسجين O<sub>2</sub> يؤدي لتكون ثاني أكسيد الكربون CO<sub>2</sub> والماء .

- 1) اكتب معادلة هذا التفاعل ووازنها .
- 2) ارسم جدول تقدم عند استعمال 10mol من C<sub>5</sub>H<sub>12</sub> و 40mol من O<sub>2</sub> . ثم حدد التقدم الأقصى .
- 3) ارسم المنحنى المعبر عن التفسير المبياني لهذا التحول .

(1) معادلة التفاعل :  $C_5H_{12}(g) + 8O_2(g) \rightarrow 5CO_2(g) + 6H_2O(g)$


(2) جدول تقدم التفاعل :

C <sub>5</sub> H <sub>12</sub> + 8 O <sub>2</sub> -----> 5 CO <sub>2</sub> + 6 H <sub>2</sub> O				معادلة التفاعل	
كمية المادة : mol				الحالات	
10	40	0	0	0	الحالة البدئية
10 - x	40 - 8x	5x	6x	x	حالة التحول
10 - x <sub>max</sub>	40 - 8x <sub>max</sub>	5x <sub>max</sub>	6x <sub>max</sub>	x <sub>max</sub>	الحالة النهائية
10 - 5 = 5	40 - 8x <sub>5</sub> = 0	5x <sub>5</sub> = 25	6x <sub>5</sub> = 30	5	

(3) إذا افترضنا أن C<sub>5</sub>H<sub>12</sub> هو المحد :  $10 - x_{max} = 0 \Leftrightarrow x_{max} = 10$

إذا افترضنا أن O<sub>2</sub> هو المحد :  $40 - 8x_{max} = 0 \Leftrightarrow 8x_{max} = 40$  أي :  $x_{max} = 5mol$

بما أن : 5mol أصغر من 10mol فإن التقدم الأقصى لهذا التفاعل :  $x_{max} = 5mol$  وبالتالي المتفاعل المحد هو : O<sub>2</sub> .




يجب عدم تمديد الخطوط بعد  $x_{\max}$  لأن التفاعل يتوقف عند هذه القيمة ويصبح تركيب الخليط في نهاية التفاعل كما يلي :  
 $n_f(H_2O) = 30 \text{ mol}$  و  $n_f(CO_2) = 25 \text{ mol}$  و  $n_f(C_5H_{12}) = 5 \text{ mol}$  و  $n_f(CO_2) = 25 \text{ mol}$

### (د) تطبيق رقم 3

يتفاعل الألومينيوم  $Al$  مع غاز ثنائي الكلور  $Cl_2$  فينتج عنه كلورور الألومينيوم  $AlCl_3$ . معادلة التفاعل تكتب كما يلي :  $Al + Cl_2 \rightarrow AlCl_3$

نعطي المنحنى المبياني الذي يمثل تغيرات كميات مادة المتفاعلات والنواتج بدلالة تقدم التفاعل .



- (1) وازن المعادلة ثم أنشئ جدول تقدم التفاعل .
- (2) حدد التقدم الأقصى والمتفاعل المحد.
- (3) مثل على المبيان تغيرات كلورور الألومينيوم و أعط تركيب الخليط عند نهاية التفاعل .

معادلة التفاعل				
$2Al + 3Cl_2 \rightarrow 2AlCl_3$			التقدم	الحالات
كميات المادة بالمول				
0,5	0,6	0	0	الحالة البدئية
$0,5 - 2x$	$0,6 - 3x$	$2x$	$x$	حالة التحول
$0,5 - 2x_{\max}$	$0,6 - 3x_{\max}$	$2x_{\max}$	$x_{\max}$	الحالة النهائية
0,1	0	0,4	0,2	

### III : تحديد ضغط غاز ناتج عن تفاعل كيميائي

#### (1) تجربة

عند الظروف التجريبية التالية : درجة الحرارة  $\theta = 20^\circ C$  و تحت الضغط الجوي  $P_{\text{atm}} = 1013 \text{ hPa}$  ندخل كتلة  $m = 32,7 \text{ mg}$  من مسحوق الزنك في حوالة حجمها  $500 \text{ mL}$  ثم نضيف إليها حجما  $V = 10 \text{ mL}$  من محلول حمض الكلوريدريك تركيزه  $c = 0,5 \text{ mol/L}$ .

فيحدث داخل الحوالة التفاعل التالي :  $Zn + 2H^+ \rightarrow Zn^{2+} + H_2$

#### (2) توقع ضغط الغاز الناتج عن التجربة

يمكن توقع الضغط النهائي لغاز ثنائي الهيدروجين الناتج عن هذا التفاعل باستعمال طريقتين :  
 - إما تجريبيا باستعمال جهاز قياس الضغط .



### الطريقة الأولى:

نسجل الضغط النهائي  $P_f$  عند انتهاء انطلاق ضغط غاز ثنائي الهيدروجين بحيث يشير الجهاز إلى القيمة  $P_f = 1038 \text{ hPa}$ .

### الطريقة الثانية:

$$n_o(\text{Zn}) = \frac{m}{M} = \frac{32,7 \cdot 10^{-3}}{65,4} = 0,5 \text{ m.mol} : \text{ كمية مادة الزنك البدئية}$$

$$n_o(\text{H}^+) = c \cdot V = 0,5 \times 10 \cdot 10^{-3} = 5 \text{ m.mol} : \text{ كمية مادة } \text{H}^+ \text{ البدئية}$$

ننشئ جدول تقدم التفاعل:

معادلة التفاعل					
Zn	+	2H <sup>+</sup>	→ Zn <sup>2+</sup>	+	H <sub>2</sub>
كميات المادة ب (m.mol)					
				التقدم	الحالات
0,5		5		0	الحالة البدئية
0,5 - x		5 - 2.x	x	x	حالة التحويل
0,5 - x <sub>max</sub>		5 - 2.x <sub>max</sub>	x <sub>max</sub>	x <sub>max</sub>	الحالة النهائية
0		4	0,5	0,5	

$$\cdot x_{\text{max}} = 0,5 \text{ m.mol} \Leftrightarrow 0,5 - x_{\text{max}} = 0 : \text{ إذا افترضنا أن Zn هو المحد}$$

$$\cdot x_{\text{max}} = 2,5 \text{ m.mol} \Leftrightarrow 5 - 2 \cdot x_{\text{max}} = 0 : \text{ إذا افترضنا أن } \text{H}^+ \text{ هو المحد}$$

بما أن : 0,5 m.mol أصغر من 2,5 m.mol فإن التقدم الأقصى لهذا التفاعل :  $x_{\text{max}} = 0,5 \text{ mol}$  وبالتالي المتفاعل المحد هو : Zn.

من خلال جدول تقدم التفاعل : كمية مادة غاز H<sub>2</sub> الناتج عند نهاية التفاعل :  $n(\text{H}_2) = x_{\text{max}} = 0,5 \text{ mol}$

بتطبيق علاقة الغازات الكاملة على غاز H<sub>2</sub> الذي يشغل الحجم المتبقي في الحوجلة :  $V(\text{H}_2) = 500 - 10 = 490 \text{ mL} = 460 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3$

$$P_{(\text{H}_2)} \cdot V_{(\text{H}_2)} = n_{(\text{H}_2)} \cdot R \cdot T \quad \text{ومنه} \quad P_{(\text{H}_2)} = \frac{n_{(\text{H}_2)} \cdot R \cdot T}{V_{(\text{H}_2)}} = \frac{0,5 \times 10^{-3} \times 8,314 \times 293}{490 \times 10^{-6}} = 2485,7 \text{ Pa} \approx 25 \text{ hPa}$$

والضغط النهائي داخل الحوجلة :  $P_f = P_{(\text{H}_2)} + P_{\text{am}} = 25 + 1013 = 1038 \text{ hPa}$  وهي توافق النتيجة المحصل عليها تجريبيا.

### التوجيهات المتعلقة بالدرس :

تطبيقات لتتبع تحول كيميائي.

- تطور مجموعة خلال تحول كيميائي: التقدم والجدول الوصفي للتطور وحصيلة المادة.

المحتوى	أنشطة مقترحة	معارف ومهارات
<ul style="list-style-type: none"> <li>تطبيقات لتتبع تحول كيميائي</li> <li>تطور مجموعة خلال تحول كيميائي</li> <li>التقدم والجدول الوصفي وحصيلة المادة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>إنجاز، تحول كيميائي يتكون خلاله ناتج في الحالة الغازية.</li> <li>إنجاز، كلما أمكن، رونانز تعرف المتفاعلات والناتج</li> <li>فيلس، عند درجة حرارة ثلثة، حجم غاز (الضغط معروف) أو ضغط غاز (الحجم معروف).</li> <li>استعمال مقومتر مطلق أو فرزي لفيلس تغير الضغط خلال التحول.</li> <li>حساب كمية مادة غازية.</li> <li>إنجاز تدرية حساب الأناك باستعمال مولات مستد</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>وصف تطور كميات المادة في مجموعة كيميائية خلال تحول بدلالة تقدم التفاعل.</li> <li>تحديد المتفاعل المحد انطلاقا من معرفة معادلة التفاعل وكميات المادة البدئية للمتفاعلات.</li> <li>توقع الحجم النهائي (الضغط معروف) أو الضغط النهائي (الحجم معروف) لمجموعة تتلح كمية المادة (الضغط معروف) عند درجة حرارة ثلثة T.</li> </ul>

التجارب	الأهداف
تتبع تحول كيميائي بواسطة قياس الضغط.	<ul style="list-style-type: none"> <li>قياس تغير ضغط غاز ناتج بدلالة حجم المتفاعل المضاف</li> <li>تتبع تطور كميات مادة المتفاعلات والناتج.</li> </ul>