



التمارين

التمرين 1

مثل وزن كرية شدة وزنها $P=0,3N$ في الحالتين التاليتين:



التمرين 2

لدينا جسم من الحديد كتلته $m = 250g$

- أحسب شدة وزن هذا الجسم عند خط الاستواء علما أن شدة الثقالة هي $g=9,78N/kg$
- تعلق هذا الجسم بدينامومتر، في مكان آخر على سطح الأرض، كما يبين الشكل جانبه. فيشير الدينامومتر إلى $2,45N$.

1-2 على ماذا تدل إشارة الدينامومتر؟

2-2 - استنتج شدة وزن الجسم، معللا جوابك.

3-2 احسب شدة مجال الثقالة في المكان الذي تم فيه تعليق الجسم بالدينامومتر.



الجدول

1- شدة الوزن عند خط الاستواء لدينا: $P = m \times g$	إذن: $P = 0,25 \times 9,78 \Rightarrow P = 2,445N$
2-1 مدلول إشارة الدينامومتر تدل إشارة الدينامومتر على شدة القوة المطبقة	$\alpha = 0,78N/kg, m = 250g = 0,25kg$

من طرف الجسم على
الدينامومتر $F = 2,45N$
2-2 : شدة وزن الجسم
حسب مبدأ التأثيرات البينية، فإن للقوتين \vec{F} و \vec{F}' القوة التي يطبقها الدينامومتر على الجسم عند النقطة A ، نفس الشدة $F = F' = 2,45N$

يخضع الجسم لقوتين \vec{F} بتأثير \vec{P} و وزن الجسم، وحسب شرط التوازن، فإن لهاتين القوتين نفس الشدة، أي: $P = F' = 2,45N$

2-3- حساب شدة مجال الثقالة
لدينا $P = m \times g \Rightarrow g = \frac{P}{m}$
إذن: $g = \frac{2,45}{0,25} = 9,8N/kg$

التمرين 3

أتمم الجدول التالي:

المكان	شدة وزن الجسم $P(N)$	كتلة الجسم $m(kg)$	شدة مجال الثقالة $g(N/kg)$
الدار البيضاء	49	---	9,80
خط الاستواء	78,24	8	---
قمة جبل توبقال	---	4	9,79
سطح القمر	19,56	12	---

لملأ الجدول نستعمل العلاقة $P = m \times g$ لحساب شدة الوزن. والعلاقة: $m = \frac{P}{g}$ لحساب الكتلة

والعلاقة: $g = \frac{P}{m}$ لحساب شدة الثقالة.

المكان	شدة وزن الجسم $P(N)$	كتلة الجسم $m(kg)$	شدة مجال الثقالة $g(N/kg)$
الدار البيضاء	49	5	9,80
خط الاستواء	78,24	8	9,78
قمة جبل تبقال	39,16	4	9,79
سطح القمر	19,56	12	1,63

نعتبر كرية فولاذية شدة وزنها تساوي 5N

1- توجد الكرية في حالة توازن على سطح أفقي كما يبين الشكل 1.

أ- اوجد القوى المسلطة على الكرية.


ب- مثل هذه القوى، باستعمال السلم التالي: 1cm → 2N

2- نميل السطح الأفقي كما يوضح الشكل 2. بحيث تبقى الكرية في حالة توازن.

مثل القوى المطبقة على الكرية في هذه الحالة باستعمال نفس السلم السابق.




الشكل 1



الشكل 2

السلم



أ- اوجد القوى المسلطة على الكرية المجموعة المدروسة: الكرية الفولاذية - قوة التماس: \vec{R} القوة التي يطبقها السطح الأفقي - قوة عن بعد: \vec{P} وزن الجسم. ب- تمثيل القوى بما أن الكرية في توازن فإن للقوتين نفس الشدة ونفس الاتجاه ومنحيين متعاكسين

شدة وزن جسم شخص في مكان يوجد على مستوى سطح الأرض هي $P=800N$ حيث شدة

الثقالة هي $g_{terre}=9,81N/kg$

1- احسب كتلة هذا الشخص.

2- ما هي كتلة هذا الشخص على سطح القمر.

3- احسب شدة وزنه على سطح القمر إذا علمت أن شدة الثقالة على سطح القمر هي $g_{lune} = \frac{g_{terre}}{6}$

السلم

1- حساب الكتلة
ترتبط كتلة جسم مع شدة وزنه بالعلاقة التالية:
2- الكتلة على سطح القمر
الكتلة مقدار ثابت، و عليه فكتلة الشخص على

إذن: $m = \frac{800}{9,81} = 81,55kg$
ومنه $P = m \times g_{terre}$
 $m = \frac{P}{g}$

سطح القمر هي نفس كتلته على سطح الأرض
التالية: $P = m \times g_{lune}$ مع

$$g_{lune} = \frac{g_{terre}}{6} = \frac{9,81}{6} = 1,635N/kg$$

$$P = 81,55 \times 1,635 = 133,33N$$

3- حساب شدة الوزن على سطح القمر

1- (أ) احسب شدة وزن جسم قرب خط الاستواء (équateur) إذا كانت كتلته تساوي 750g.

(ب) ما هي شدة وزن هذا الجسم على سطح القمر حيث شدة الثقالة تساوي سدس شدة الثقالة على

سطح الأرض قرب خط الاستواء. نعطي شدة الثقالة قرب خط الاستواء: $g_{terre}=9,78N/kg$

2- احسب شدة وزن الجسم السابق على سطح كل من الكواكب التالية:

عطارد (Mercure): $g_{mercure}=3,6N/kg$

أورانوس (Uranus): $g_{uramus}=11,6N/kg$

الزهرة (Vénus): $g_{venus}=8,8N/kg$

المريخ (Mars): $g_{mars}=3,7N/kg$

السلم

1- (أ) شدة وزن الجسم قرب خط الاستواء

$$P = m \times g_{terre}$$

$$\text{ومنه: } P = 0,750 \times 9,78 = 7,335N$$

(ب) شدة وزن الجسم على سطح القمر

$$\text{لدينا: } P = m \times g_{lune}$$

$$\text{مع } g_{lune} = \frac{9,78}{6} = 1,63N/kg$$

$$\text{إذن: } P = 0,75 \times 1,63 = 1,22N$$

2- حساب شدة وزن الجسم على سطح الكواكب

$$P = m \times g$$

المكان	شدة الثقالة (N/kg)	شدة وزن الجسم (N)
عطارد	3,6	2,70
أورانوس	11,6	8,70
الزهرة	8,8	6,60
المريخ	3,7	2,77

أثناء رحلة فضائية إلى القمر قام رائد فضاء بجمع مجموعة من الأحجار ووضعها في كيس، ثم نقل

الكيس إلى المركبة الفضائية وقام بقياس شدة وزن الكيس على سطح القمر فوجد 400N.

عند رجوعه إلى الأرض لم يستطيع حمل هذا الكيس. كيف تفسر ذلك؟

- 1- مثل وزن القمر الاصطناعي عند الأوضاع الثلاثة (A) و (B) و (C) و (D) مستعملا سلما مناسباً. (نعتبر أن شدة وزن القمر الاصطناعي لا تتغير خلال الدوران).
- 2- مثل القوة $\vec{F}_{S/T}$ المطبقة من طرف القمر الاصطناعي على الأرض عند الموضع (A) معللاً جوابك. (نعتبر أن نقطة تأثير هذه القوة هو مركز الأرض).

التمرين 8

1- تمثيل وزن القمر الاصطناعي

لتمثيل وزن القمر الاصطناعي نستعمل السلم التالي: $100000N \rightarrow 1cm$. وبالتالي يكون طول السهم الممثل للوزن هو $1,5cm$.

نمثل بالتتابع \vec{P}_A ، \vec{P}_B ، \vec{P}_C و \vec{P}_D وزن القمر الاصطناعي في المواضع (A) و (B) و (C) و (D).

لا تتغير شدة وزن القمر الاصطناعي خلال الدوران: $P_A = P_B = P_C = P_D$.

ويتجه السهم الممثل لكل منها دائماً نحو مركز الأرض.

2- تمثيل القوة $\vec{F}_{S/T}$

حسب مبدأ التأثيرات المتبادلة \vec{P}_A و $\vec{F}_{S/T}$ قوتان متعاكستان. (انظر الشكل)

لنحسب كتلة الأحجار التي أتى بها الرائد من القمر: $m = \frac{P}{g_{lune}} \Rightarrow m = \frac{400}{1,63} = 652kg$

وهي شدة كبيرة مما يفسر عدم استطاعة الرائد حمل الأحجار على سطح الأرض.

أي أن: $P = m \times g_{terre}$

$P = 652 \times 9,81 = 6396,12N$

يتدرب حامل أقتال روسي في مدينة موسكو من أجل المشاركة في بطولة العالم التي ستجرى أطوارها بمدينة كيوتو بالايكادور.

الرقم القياسي لهذا الرباع $230kg$ في مدينة موسكو.


هل باستطاعة هذا الرباع تحسين رقمه القياسي في مدينة كيوتو؟ إذا كان الجواب بنعم فيكم بحسن رقمه الشخصي؟

نعطي شدة مجال الثقالة في:

مدينة كيوتو: $g_{kioto} = 9,776N/kg$

مدينة موسكو: $g_{moscou} = 9,815N/kg$

التمرين 10



إذا علمت أن شدة وزن الجسم تتناسب مع مربع المسافة التي تفصل مركز الأرض عن هذا الجسم، أي أن شدة وزنه تقسم على 4 إذا تضاعفت المسافة مرتين وتقسّم على 9 إذا تضاعفت المسافة ثلاث مرات وهكذا....

نعتبر شدة الثقالة على سطح الأرض تساوي $g = 9,81N/kg$

1- أحسب شدة وزن جسم، كتلته $30kg$ على سطح الأرض.

2- أحسب شدة وزن الجسم عند الارتفاع $h_1 = 6400km$ وعند الارتفاع $h_2 = 12800km$.

نعم يمكن لهذا البطل تحسين رقمه القياسي لأن شدة الثقالة في موسكو أكبر من شدة الثقالة في كيوتو: $g_{moscou} > g_{kioto}$


بإمكان البطل أن يرفع نفس الوزن P بمدينة كيوتو أو بمدينة موسكو غير أن الوزن P لا تقابله نفس الكتلة في المدينتين.

لنحسب شدة الوزن الذي يمكن رفعه بمدينة موسكو: $P = 230 \times 9,815 = 2257,45N$

لنحسب الكتلة التي لها نفس الوزن P في مدينة كيوتو: $m = \frac{2257,45}{9,776} = 230,91kg$

يمكن إذن، لهذا البطل أن يحسن رقمه القياسي تقريبا ب: $230,91 - 230 = 0,91kg = 910g$

التمرين 9



يدور قمر اصطناعي حول الأرض في سمار دائري مركزه يطابق الأرض على ارتفاع $700km$.

إذا علمت أن شدة وزن القمر الاصطناعي عند هذا الارتفاع

1- شدة وزن الجسم على سطح الأرض

لدينا: $P_0 = m \times g_0$ مع P_0 و g_0 شدة وزن الجسم وشدة الثقالة على سطح الأرض

2- شدة وزن الجسم عند الارتفاع h

عندما يكون الجسم على سطح الأرض تكون $P_0 = 30 \times 9,81 \Rightarrow P_0 = 294,3N$




بحساب الإطالة

من المنحنى نلاحظ أن الإطالة الناتجة

عن تعليق هذه الجسم هي: $\Delta l = 70mm$


نحسب أولاً شدة وزن الجسم المعلق:

$$P = m \times g \Rightarrow P = 0,350 \times 10 = 3,5N$$



التمرين 12

نضع جسماً صلباً في توازن فوق سطح أفقي (الشكلين (أ) و (ب)).



الشكل (أ)

الشكل (ب)

1- ماذا تمثل كل قوة من القوى التالية: \bar{P} ; \bar{R} ; \bar{F} وما شدة كل

قوة منها، علماً أن السلم الذي استعمل في تمثيلها هو $1cm \rightarrow 2N$.

2- حدد ما هي الحالة التي تم فيها تطبيق مبدأ التأثيرات البينية

وفي أي حالة تم تطبيق شرطي التوازن.

السطح الأفقي لأن لها نفس اتجاه \bar{R} ومنحنيان

1- أسماء القوى

كما أن نقطة تأثير القوة \bar{P} هو G مركز ثقل

الجسم وأن منحاهما نحو الأسفل، واتجاهها

رأسي، فهي تمثل إذا: وزن الجسم

كما أن الجسم في توازن وخاضع للقوتين،

وأن \bar{R} و \bar{P} لهما نفس الاتجاه، ومنحنيان

متعاكسان ونفس طول السهم الممثل لهما،

فإن \bar{R} تمثل تأثير السطح على الجسم.

السطح الأفقي لأن لها نفس اتجاه \bar{R} ومنحنيان

متعاكسان ونفس طول السهم الممثل لهما.

كما أن طول السهم الممثل لكل من القوى

الثلاثة يساوي $1,25cm$ ، وأن السلم

المستعمل في تمثيلها هو: $1cm \rightarrow 2N$

فإن شدة هذه القوى هي: $1,25 \times 2 = 2,5N$

أي أن: $P = F = R = 2,5N$

2- المبدأ المطبق في كل حالة

المسافة التي تفصله عن مركزها تساوي شعاع

الأرض، أي $6400km$ ، وشدة وزنه هي P_0

عند الارتفاع تكون $h_1 = 6400km$ المسافة

التي تفصله عن مركز الأرض هي $R + h_1$ أي

$$3 \times 6400 = 19200km$$

إذن المسافة بين الجسم وسطح الأرض

تضاعفت ثلاثة مرات وعليه فإن شدة وزن

الجسم عند هذا الارتفاع تساوي $\frac{1}{9}$ من شدة

وزنه على سطح الأرض، إذن $P_2 = \frac{P_0}{9}$

$$P_2 = \frac{294,3}{9} = 32,7N$$

أي أن $P_2 = 32,7N$

$$2 \times 6400 = 12800km$$

إذن المسافة بين الجسم وسطح الأرض هي

ضعف المسافة الأولى، وعليه فإن شدة وزن

الجسم عند هذا الارتفاع تساوي $\frac{1}{4}$ من شدة

وزنه على سطح الأرض (لأن المسافة التي

تفصله عن مركز الأرض قد تضاعفت

مرتين)، وعليه نكتب: $P_1 = \frac{P_0}{4}$

التمرين 11

يمثل المنحنى تغيرات إطالة نابض مرن

بدلالة شدة القوة المسلطة عليه.

1- ما هو شكل هذا المنحنى؟ ماذا تستنتج؟


2- باستعمل المنحنى حدد

أ- شدة وزن الجسم الذي يؤدي إلى

إطالة تساوي $10mm$

ب- الإطالة الناتجة عن تعليق جسم كتلته $350g$

نعطي شدة الثقالة $g = 10N/kg$.



السطح الأفقي لأن لها نفس اتجاه \bar{R} ومنحنيان

1- شكل المنحنى

المنحنى الذي يمثل تغيرات Δl إطالة النابض

بدلالة شدة القوة المؤثرة عليه منحنى خطي.

نستنتج إذا أن إطالة النابض تتناسب طراداً مع

2- أ- شدة وزن الجسم


نستنتج من المنحنى أن شدة وزن الجسم الذي

يؤدي إلى إطالة تساوي $10mm$ هي $P = 0,5N$

(أنظر الشكل أسفله)

التمرين 14

يمثل الشكل جانبه، إناء فارغاً موضوعاً فوق طاولة.



1- حدد :

✓ الجسم (S_1) الذي يسلط القوة \vec{F}_1 الممثلة على الشكل.

✓ الجسم (S_2) المطبقة عليه هذه القوة.

2- أملأ الجدول أسفله علماً أن \vec{F}_2 هي القوة المسلطة من طرف الجسم (S_2) على الجسم (S_1)

السلم المستعمل في تمثيل القوة \vec{F}_1 هو: $1cm \rightarrow 2N$

مميزات القوى	نقطة التأثير	الاتجاه	المنحى	الشدة
\vec{F}_1				
\vec{F}_2				

3- مثل القوة \vec{F}_2 على نفس الشكل السابق، بنفس السلم المستعمل في تمثيل \vec{F}_1 .

الجدول

1- تحديد الجسمين (S_1) و (S_2)

✓ بما أن الإناء موضوع فوق الطاولة،

فهو يطبق عليها قوة نحو الأسفل. وبما أن

منحى القوة \vec{F}_1 الممثلة على الشكل هو أيضاً

نحو الأسفل، فإن الجسم (S_1) الذي يسلط هذه

القوة هو الإناء.

✓ أما الجسم (S_2) التي تطبق عليه هذه

القوة فهو الطاولة

2- ملأ الجدول


يتضمن الجدول مميزات القوتين \vec{F}_1 و \vec{F}_2

تم حساب شدة \vec{F}_1 اعتماداً على السلم

المستعمل في تمثيلها. $F_1 = 3N$

تم تحديد مميزات \vec{F}_2 اعتماداً على مبدأ

التأثيرات البينية.



طرف جسمين مختلفين، وهما الأرض (بالنسبة ل \vec{P}) والسطح، (بالنسبة ل \vec{R}) على جسم واحد. إذا لم يتم تطبيق شرطي التوازن. الشكل (ب): القوتان \vec{F} و \vec{R} هما قوتان متبادلتان، أي مطبقتان من طرف جسمين على بعضهما البعض (الجسم والسطح). إذا لم يتم تطبيق مبدأ التأثير البيني.

التمرين 13

لاقتلاع مسمار مثبت في حائط، نجره بواسطة خيط، مثبت بدينامومتر كما يبين الشكل جانبه، فنلاحظ أن الدينامومتر يشير إلى $9N$.

1- اجرد القوى المطبقة على المسمار، وصنفها إلى قوى تماس وقوى عن بعد.

2- حدد مميزات \vec{T} القوة المطبقة من طرف الخيط على المسمار، ومثلها

بالسلم: $1cm \rightarrow 3N$

3- استنتج مميزات القوة المطبقة من طرف المسمار على الخيط

معللاً جوابك، ثم مثلها بنفس السلم السابق.

الجدول

3- مميزات القوة المطبقة من طرف المسمار

بما أن الخيط يسلط قوة \vec{T} على المسمار، فإنه

حسب مبدأ التأثيرات المتبادلة (التأثيرات

البينية) المسمار يسلط بدوره وفي نفس الوقت

قوة \vec{T}' على الخيط، بحيث للقوتين نفس الشدة،

نفس الاتجاه ومنحيان متعاكسان.

ومنه فمميزات \vec{T}' هي:

نقطة التأثير	الاتجاه	المنحى	الشدة
النقطة A	المستقيم المائل المار من A	من A نحو الأعلى	$T' = 9N$

تمثيل القوة: انظر الشكل أسفله



1- اجرد القوى المطبقة على المسمار

المجموعة المدروسة: المسمار

قوى التماس:

\vec{F} : القوة المقرونة بتأثير الحائط


\vec{T} : القوة المقرونة بتأثير الخيط

قوى عن بعد: \vec{P} وزن المسمار

2- مميزات القوة \vec{T}


نقطة التأثير	الاتجاه	المنحى	الشدة
النقطة A	المستقيم المائل المار من A	من A نحو اليد	$T = 9N$

تمثيل القوة: انظر الشكل أسفله



يمثل الشكل نابضين متصلين في النقطة A طولهما الأصلي $l_0=20cm$ وشدة القوة المطبقة من طرف النابض الأول R_1 على النابض الثاني R_2 هي $8N$.

نرمز للقوة المطبقة من طرف النابض R_1 على النابض الثاني R_2 بـ $\vec{F}_{\frac{1}{2}}$ وللقوة المطبقة من طرف



النابض R_2 على النابض الثاني R_1 بـ $\vec{F}_{\frac{2}{1}}$.

1- حدد: مميزات القوتين $\vec{F}_{\frac{1}{2}}$ و $\vec{F}_{\frac{2}{1}}$.

2- مثل هاتين القوتين بسلم مناسب.

3- احسب إطالة النابض R_1 وإطالة النابض R_2 .

السؤال

1- مميزات القوتين $\vec{F}_{\frac{1}{2}}$ و $\vec{F}_{\frac{2}{1}}$


تخضع هاتان القوتان لمبدأ التأثيرات البينية فلهما نفس الاتجاه ومنحيين متعاكسين ونفس الشدة.

يلخص الجدول التالي مميزات هاتين القوتين

الشدة	المنحى	الاتجاه	نقطة التأثير	
$F_{\frac{1}{2}} = 8N$	من A نحو B	المستقيم الأفقي	النقطة A	$\vec{F}_{\frac{1}{2}}$
$F_{\frac{2}{1}} = 8N$	من A نحو C	المستقيم الأفقي	النقطة A	$\vec{F}_{\frac{2}{1}}$

2- تمثيل القوتين

انظر الشكل أسفله: السلم $1cm \rightarrow 4N$



نعلق جسما متجانسا (S)، شدة وزنه تساوي $7N$ ، بخيط كتلته مهملة.

1- بدراسة توازن الجسم (S) واستنتج مميزات القوة \vec{T} المسلطة من طرف الخيط

على الجسم (S)

2- حدد مميزات القوة \vec{F} المسلطة من طرف الجسم (S) على الخيط ومثلها

باستعمال السلم: $1cm \rightarrow 1N$

3- ما هي مميزات القوة \vec{F} المسلطة من طرف الحامل على الخيط؟ مثل هذه القوة باستعمال نفس

السلم السابق.

السؤال

1- مميزات القوة \vec{T}

الجسم (S) في حالة توازن تحت تأثير القوتين:

✓ نقطة التأثير: النقطة B

✓ الاتجاه: الخط الرأسي

✓ المنحى: نحو الأسفل

✓ الشدة: $F=T=7N$

التمثيل (انظر الشكل أسفله)

3- مميزات القوة \vec{F}

الخيط في حالة توازن تحت تأثير

القوتين \vec{F} و \vec{F}'

لهاتين لقوتين إذا منحيين متعاكسين

. ونفس الاتجاه ونفس الشدة

وبما أننا نعرف مميزات القوة \vec{F}

فإنه نستنتج مميزات القوة \vec{F}'

✓ نقطة التأثير: النقطة A

✓ الاتجاه: الخط الرأسي

✓ المنحى: نحو الأعلى

✓ الشدة: $F'=1,7N$

2- مميزات القوة \vec{F}

حسب مبدأ التأثير المتبادلة القوتان:

\vec{T} القوة المطبقة من طرف الخيط على الجسم

\vec{F} القوة المطبقة من طرف الجسم على الخيط


لهما نفس الاتجاه ومنحيان متعاكسان ونفس

الشدة $(F=T=1,7N)$.

مميزات القوة \vec{F} هي إذا:



نعلق كرية فولاذية، شدة وزنها $0,2N$ إلى الطرف الحر ل نابض كما يبين الشكل جانبه.



- 1- اجرد القوى المطبقة على الكرية، وصفها إلى قوى تماس وقوى عن بعد.
- 2- استنتج مميزات القوة المطبقة من طرف النابض على الكرية، معللا جوابك.
- 3- استنتج مميزات القوة المطبقة من طرف الكرية على النابض، معللا جوابك.
- 4- مثل القوى التالية، باستعمال السلم: $1cm \rightarrow 0,1N$

\vec{P} : وزن الكرية

\vec{T} : القوة المطبقة من طرف النابض على الكرية

\vec{F} : القوة المطبقة من طرف الكرية على النابض

الـ

1- جرد القوى المطبقة على الكرية المجموعة المدروسة: الكرية قوى التماس:

\vec{T} القوة التي يطبقها النابض على الكرية قوى عن بعد: \vec{P} وزن الكرية

2- مميزات القوة \vec{T}

- حسب شرط توازن جسم خاضع لقوتين، فإن للقوتين المطبقتين على الكرية، نفس الاتجاه، نفس الشدة و منحيين متعاكسين.

تكون إذن مميزات \vec{T} القوة المطبقة من طرف النابض على الكرية كالتالي:

- ✓ نقطة التأثير: النقطة C
- ✓ الاتجاه: المستقيم الرأسى المار من C
- ✓ المنحى: من C نحو الأعلى
- ✓ الشدة: $T=P=0,2N$


3- مميزات القوة \vec{F}

(تأثير النابض على الكرية عند النقطة C)


\vec{F} وتأثير الكرية على النابض عند النقطة C) نفس الشدة، نفس الاتجاه و منحيين متعاكسين، ومنه فمميزات \vec{F} القوة المطبقة من طرف الكرية على النابض هي:

- ✓ نقطة التأثير: النقطة C
- ✓ الاتجاه: المستقيم الرأسى المار من C
- ✓ المنحى: من C نحو الأسفل
- ✓ الشدة: $F=T=0,2N$

4- تمثيل القوى



ننجز التجربة الممثلة في الشكل جانبه، حيث يشير الدينامومتر إلى $2,5N$ حيث توجد المجموعة {الجسم C - البكرة} في توازن.



- 1- اجرد القوى المطبقة على الجسم C ، مع تصنيفها إلى قوى تماس وقوى عن بعد.
- 2- ماهي شدة القوة المطبقة من طرف الخيط على الجسم C عند النقطة A؟ علل جوابك.
- 3- استنتج شدة وزن الجسم C معللا جوابك.
- 4- مثل القوى المطبقة على الجسم C مستعملا السلم $1cm \rightarrow 1N$

الـ

1- جرد القوى المطبقة على

المجموعة المدروسة: الجسم C.

قوى التماس: \vec{T}_A القوة المقرونة بتأثير

الخيط

قوى عن بعد: \vec{P} وزن الجسم C

2- شدة القوة \vec{T}_A

الشدة $2,5N$ التي يشير إليها الدينامومتر

تمثل شدة القوة \vec{T}_B المسلطة من طرف الخيط

على الدينامومتر، وحسب مبدأ التأثيرات

البيئية فإن القوة \vec{T}_B التي يسقطها الدينامومتر

على الخيط، عند النقطة B لها نفس شدة

القوة \vec{T}_B ونكتب: $T'_B = T_B = 2,5N$.

توجد البكرة توازن، فالقوتان \vec{T}_B المسلطة

من طرف الدينامومتر على الطرف B للخيط

و \vec{T}_A المسلطة من طرف الجسم C على

الطرف A للخيط لهما نفس الشدة، وذلك حسب

شرط توازن البكرة

نكتب إذا: $T'_A = T'_B = 2,5N$

حسب مبدأ التأثيرات البيئية، فالقوتان \vec{T}_A

المسلطة من طرف الجسم C على الخيط عند

النقطة A و \vec{T}_A المسلطة من طرف الخيط

على الجسم C عند النقطة A لهما نفس الشدة،

نكتب إذا: $T_A = T'_A = 2,5N$

3- شدة وزن الجسم C

دراسة توازن الجسم C

حسب شرط التوازن، فإن \vec{T}_A و \vec{P} لهما نفس

الاتجاه، و منحيان متعاكسان، ونفس شدة

$P = T_A = 2,5N$

4- تمثيل القوى المطبقة على الجسم C

السلم $1cm \rightarrow 1N$

